

Folgende Medikamente sollten für den Bedarfsfall verordnet werden:

Indikation	Medikament	Wirkstoff	Verabreichungsform	Dosierung	Intervall
Starke Schmerzen/ Luftnot	Morphin 10mg/ml	Morphin	s. c.	0,5 Amp. (5mg) 1 Amp. (10mg)	Alle 4-6 Stunden
Schmerzen / Fieber	Novalgin 1000mg	Metamizol	i. m. / s. c. oral	1 Ampulle 1x40° / 1x1 Tbl.	Alle 2-6 Stunden max. 4x40° / 4x2 Tbl.
Unruhe / Schlafstörung Angst / Luftnot	Tavor Expedit 1,0 mg	Lorazepam	s. l.	1 Plättchen	max. 7,5 mg tägl.
Übelkeit	Vomex 100mg	Dimenhydrinat	s. c. Zäpfchen	1 Ampulle 1x1	bis 3 x tägl. bis 3 x tägl.
Sedierung	Midazolam 2mg/ml	Midazolam	s. c. / Nasal als Spray / bukkal	1 Ampulle	Nur nach Arzt – Rücksprache

Weiter empfehlen wir nach Bedarf:

Dyspnoe	Bricanyl 0,5mg	Terbutalin	s. c	1 Ampulle	3 Ampullen tägl.
Unruhe	Diazepam 10mg Diazepam	Diazepam	i. m. Tropfen	0,5 – 1 Ampulle 5-10 Tropfen	Alle 4-6 Stunden bis 3x tägl.
Übelkeit / Erbrechen	Haloperidol	Haloperidol	s. c. Tropfen	0,5 Ampullen 1x 3 °	bis 3 x tägl. bis 4 x tägl.
Obstipation	Laxoberal	Natriumpicosulfat	Tropfen	5 - 15 °	bis 3x tägl.
Finales Rasseln / Krampf- zustände	Buscopan 20mg	Butyscopolamin	s. c.	10 – 20 mg	bis 3 x tägl.
Starke Ödeme	Furosemid 20 mg	Furosemid	i. v.	1 Ampulle	Nur mit Arzt!!!
Hirnödem/Schocklunge	Dexaflam	Dexamethason	i. m. / i. v.	1 Ampulle	Nur nach Arzt – Rücksprache